



## South Central Public Health District

Prevent. Promote. Protect.

1020 Washington Street N • Twin Falls, ID 83301

(208) 737-5900

### PROFILAXIS PARA LA TULAREMIA

DEPENDIENDO DE SU EDAD, PESO Y CONDICIONES MEDICAS PREEXISTENTES, SUS ANTIBIÓTICOS PUEDEN VARIAR DE ÉSOS ENUMERADOS ABAJO.

#### Adultos:

- Doxycycline: 100mg píldoras dos veces al día por 14 días  
○
- Ciprofloxacín: 500mg píldoras dos veces al día por 14 días

#### Niños:

- Doxycycline píldoras dos veces al día por 14 días (la dosis exacta depende del peso del niño)  
○
- Ciprofloxacín píldoras dos veces al día por 14 días (la dosis exacta depende del peso del niño)

#### Mujeres Embarazadas:

- Doxycycline: 100mg píldoras dos veces al día por 14 días  
○
- Ciprofloxacín: 500mg píldoras dos veces al día por 14 días

**USTED DEBE TOMAR TODA LA MEDICACIÓN DURANTE EL PERÍODO RECOMENDADO.**

**SI USTED EXPERIMENTA ALGUNA SÍNTOMA,  
PONGASE EN CONTACTO CON UN PROVEEDOR DEL CUIDADO MÉDICO  
INMEDIATAMENTE.**